

AVERTISSEMENTS AGRICOLESEdition
Cultures Spéciales

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

REGION CENTRE

Supplément N° 6 au Bulletin technique N° 5

23 Mars 1994

- EDITION VIGNE 3 -**ESCA**

: Ne plus traiter avec l'arsenite de soude (risque de phytotoxicité).

ACARIOSE - ERINOSE: Sur parcelles attaquées lors de la dernière campagne, intervenir en pré-débourrement.
Fiche de produits utilisables à conserver.**COUPE-BOURGEOIS**

: Attention aux dégâts. Surveillez vos parcelles.

PHENOLOGIE

A la faveur des températures relativement douces de ces derniers jours, la vigne a pu amorcer une reprise de végétation. En Touraine, le Chardonnay et l'Arbois ont atteint le stade C (05) et l'ensemble des cépages (Gamay, Côt, Sauvignon, Cabernet) sont au stade B (03).

ESCA

Les conditions climatiques douces et humides ont favorisé le départ en végétation de la vigne. Les bourgeons ont commencé à gonfler. A ce stade, il est trop tard pour appliquer de l'arsenite de soude, le risque de phytotoxicité peut survenir.

ACARIOSE

Contrairement aux fortes attaques de 1992, des symptômes ont été observés au cours de la campagne 1993. Sur parcelles attaquées, il sera nécessaire d'intervenir au stade B (03) avec un soufre mouillable ou avec un oléoparathion du stade bourgeon dans le coton B (03) au stade pointe verte C (05).

ERINOSE

L'Erinose a été observée en 1993 sur l'ensemble du vignoble avec un pourcentage d'attaque très minime par rapport aux années précédentes. Ce parasite a rarement une grosse incidence sur la plante. Néanmoins, sur forte attaque, intervenez avec du soufre mouillable dont l'efficacité est évidente sur acariens et oïdium.

CICADELLE DE LA FLAVESCEDE DOREE

La lutte contre la cicadelle vectrice de la flavescence dorée est obligatoire dans les vignes mères de greffons ou de porte-greffes. Intervenir avec des oléoparathions au stade 03 (bourgeon dans le coton) - 05 (pointe verte).

COUPE-BOURGEOIS

Avec le gonflement des bourgeons, il est indispensable de bien surveiller les parcelles subissant des attaques répétées de noctuelles, boarmies, otiorrhynques, notamment dans le Sancerrois et à Quincy (18). Les premières boarmies ont été observées à Oisly (41).

direction régionale de l'agriculture et de la forêt

ARBORICULTURE : 250 F
VITICULTURE : 220 F
CULTURES LEGUMIERES : 220 F

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX CENTRE
93, rue de Curambourg - BP 210 - 45403 FLEURY LES AUBRAIS Cédex
Tél. 38.86.36.24 - Fax 38.84.19.79



Sur les coupe-bourgeons, intervenir dès les premiers dégâts avec :

Produit	Matière active
En pulvérisation	
FASTAC	alphaméthrine
BAYTHROID	cyfluthrine
DECIS	deltaméthrine
CYMBUSH KAFIL RIPCROD SHERPA 10 MASTOR	cyperméthrine
KARATE	lambda-cyhalothrine
Spécialités d'appâts prêts à l'emploi	
SEVIN APPATS	carbaryl
VOLATON	phoxine
DURSBAN	chloropyriphos éthyl
Spécialités à préparer avec 100 kg de son	
SHERPA	cyperméthrine
DRIFENE AF	endosulfan + parathion

PHYTOMA - La Défense des Végétaux
BULLETIN D'ABONNEMENT SPECIAL RESERVE aux Abonnés aux Avertissements Agricoles
Offre valable jusqu'au 31 Décembre 1994

M., Mme, Sté :
Adresse :
Code Postal : Ville :

☐ souscrit un abonnement d'un an (11 numéros + cahiers de Phytoma - La Défense des Végétaux)
Au tarif exceptionnel de 247 F au lieu de 310 F
A retourner au Service Abonnement "Phytoma - La Défense des Végétaux" :
4, rue André Boule - 94942 CRETEIL Cédex 09

AVA94

ACARIOSE DE LA VIGNE : LES PRODUITS UTILISABLES

Au stade "BOURGEON D'HIVER", jusqu'au tout début gonflement

Matières actives	Spécialités commerciales	Dose spécialité/hl	Observations
huiles jaunes	Nombreuses spécialités	2 à 3 l	Efficacité très liée à la qualité de la pulvérisation (lessivage) et à la date d'application, le plus près possible du gonflement.

Au stade "BOURGEON DANS LE COTON"

Matières actives	Spécialités commerciales	Dose spécialité/hl	Observations
soufre mouillable	Nombreuses spécialités	2 kg ou 2,5 l	Efficace également sur Erinose.

stade "BOURGEON DANS LE COTON" et "POINTE VERTE"

Matières actives	Spécialités commerciales	Dose matière active/hl	Observations
oléoparathion	Nombreuses spécialités	45 g	

En végétation : AU PRINTEMPS

Matières actives	Spécialités commerciales	Dose spécialité/hl	Observations
dicofol	Nombreuses spécialités	480 à 540 g m.a.	
bromopropylate	Néoron	2 l	
fenpropathrine	Danitol	0,75 l	
monocrotophos	Azodrin 20	1,5 l	

En végétation : EN ETE

Matières actives	Spécialités commerciales	Dose spécialité/hl	Observations
dicofol	Nombreuses spécialités	480 à 540 g m.a.	
propargite	Omite New	1,5 l	
	Omite 30 WP	3 kg	
propargite + tetradifon	Acaryl Pro	2 l	
clofentézine + fenpropathrine	Viktor CL	0,5 l + 0,5 l	
clofentézine + bifenthrine	Torant CL	0,5 l	
	Gemini		
clofentézine + propargite	Omite Plus CL	0,5 l + 1 l	
	Orion CL		
bromopropylate	Neoron	2 l	
cyhexatin + tetradifon	Draca	0,6 l	
fenbutatin oxyde + flufenoxuron	Gemm	0,636 l + 0,375 l	

